SPRING 2017 DATA FOR COCKTOWN CREEK

Species	Site 1 to 2	Site 2 to 3	Site 3 to 4	Site 4 to 5	Site 5 to 6	Site 6 to 7	Site 7 to 8	Site 8 to 9	Site 9 to 10	Total SAV observed	Frequency (In 58 Surveys)	% of total SAV found
Coontail	1	3	0	1	2	4	4	5	0	20	57%	27%
Curly Pondweed	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4	11%	5%
Wild Celery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Common Waterweed	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3%	1%
Slender Pondweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Hydrilla	3	3	2	2	6	4	4	4	0	28	80%	38%
Horned Pondweed	3	2	1	1	3	0	2	4	0	16	46%	22%
Naiad	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4	11%	5%
Southern Naiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Species "richness"	4	3	4	4	4	2	4	6	0			
Total Observed at Site	8	8	5	5	12	8	11	16	0	73		
No SAV found	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	